

中晩柑農薬使用基準

萩市・JA山口県 萩統括本部

| 病虫害名等 | 農薬名 | 使用濃度 | 収穫前日数 (使用時期) | 使用できる 回数 | 備考 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| かいよう病 | ICボルドー66D | 40倍 | — | — | 発芽前 新梢伸長期及び高温期の散布は避ける |
| | | 60倍 | — | — | |
| | コサイド3000 | 1000倍 | 発芽前 | — | クレフノン 200倍を加用する |
| | | 2000倍 | 生育期 | — | |
| 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 | 90日前まで | 4回以内 | |
| | エムダイファー水和剤 | 600倍 | 90日前まで | 2回以内 | |
| ハダニ類、カイガラムシ類 | トモノールS | 60倍 | 12～3月 | — | 3月上旬まで |
| ハダニ類、ヤノネカイガラムシ幼虫 | | 150倍 | 夏期 | — | 6月中旬頃 |
| ミカンハダニ ミカンサビダニ | コロマイト水和剤 | 2000倍 | 7日前まで | 2回以内 | |
| | ダニエモンフロアブル | 5000倍 | 7日前まで | 1回 | |
| | ダニゲッターフロアブル | 2000倍 | 収穫前日まで | 1回 | |
| | サンマイト水和剤 | 3000倍 | 3日前まで | 2回以内 | |
| | ダニカット乳剤20 | 1000倍 | 60日前まで | 1回以内 | |
| コアオハナムグリ ケシキスイ類「訪花昆虫」 | モスピラン顆粒水溶剤 | 3000倍 | 14日前まで | 3回以内 | |
| ゴマダラカミキリ「天牛」 | モスピラン顆粒水溶剤 | 200倍 | 14日前まで | 3回以内 | 産卵～幼虫喰入期前 |
| チャノキイロアザミウマ 「スリップス」 | アドマイヤーフロアブル | 5000倍 | 14日前まで | 3回以内 | |
| | コテツフロアブル | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
| ミカンハモグリガ 「エカキムシ」 | アドマイヤーフロアブル | 5000倍 | 14日前まで | 3回以内 | |
| | ダントツ水溶剤 | 3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
| カネタタキ | コテツフロアブル | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
| 貯蔵病害（青かび病・ 緑かび病・軸腐病） | ベンレート水和剤 | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
| | トップジンM水和剤 | 2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
| | ベフトップジンフロアブル | 1500倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
| へた落ち防止 | マデックEW | 2000～3000倍 | 収穫開始予定日の 20～10日前 | 1回 | |
| カイガラムシ類 | スプラサイド乳剤40 | 1500倍 | 90日前まで | 4回以内 | |
| ナメクジ類 | スラゴ | 1～5g/m ² | 発生時 | — | 株元配置 |
| 雑草 | ラウンドアップ マックスロード | 水100リットルに200～500ml を希釈して使用（10a） | 7日前まで | 5回以内 | 一年生雑草 |
| | | 水100リットルに500～1000ml を希釈して使用（10a） | 7日前まで | 5回以内 | 多年生雑草 |
| | プリグロックスL | 水150リットルに800～1000ml を希釈して使用（10a） | 収穫前日まで | 5回以内 | 一年生雑草 |
| | | 水150リットルに1500～2000ml を希釈して使用（10a） | 収穫前日まで | 5回以内 | 多年生雑草 |
| | バスタ液剤 | 水150リットルに300～500ml を希釈して使用（10a） | 21日前まで | 3回以内 | 一年生雑草 草丈30cm以下 |
| | | 水150リットルに500～1000ml を希釈して使用（10a） | 21日前まで | 3回以内 | 多年生雑草 草丈30cm以下 |

※ 病虫害名等欄の「 」内は俗称

令和2年1月作成

農薬使用基準厳守！